

Stai accedendo all'anteprima della nuova versione del portale di AgroAmbiente.Info. Per l'accesso ufficiale si prega di usare il **sito originale** (<http://agroambiente.info.arsia.toscana.it>)

← Settimana precedente

AR FI GR LI LU MS PI PO PT SI



Regione Toscana

REGIONE TOSCANA
Servizio fitosanitario

Agroambiente.info

Provincia di Grosseto - Bollettino Vite Integrato del 2019-08-08

Fenologia



La fase fenologica prevalente è "invaiaatura 50%".

Peronospora



Non è stata segnalata la presenza di sintomi. Nei vigneti nei quali sono presenti acini invaiati, il livello di rischio di infezioni è ritenuto basso, in quanto in questa fase fenologica i grappoli sono ormai non più suscettibili. E' possibile intervenire ai turni più lunghi in etichetta con prodotti di copertura per proteggere sia i grappoli non ancora invaiati che le foglie. Dove gli acini sono ancora acerbi ripristinare le coperture anche a turni brevi in caso di previste precipitazioni.

Si segnala che il limite di impiego di prodotti rameici è stato abbassato a 28 kg/ha di rame metallo nell'arco dei prossimi 7 anni, vale a dire in media 4 kg/ha/anno (Reg. (UE) n. 2018/1981). Le nuove etichette dei prodotti a base di rame raccomandano di non superare questa quantità.

- ✚Approfondimento
- ✚Prodotti ammessi
- ✚Fotogallery sintomi

Botritis



Attualmente non sono state osservate infezioni importanti. Con l'invasatura, la suscettibilità a questo patogeno è in aumento. Monitorare con attenzione i vigneti e nel caso in cui si rilevino infezioni, intervenire con antibiotritici specifici. Sono, inoltre, di fondamentale importanza le operazioni di sfogliatura e sistemazione dei grappoli, che permettono un maggior arieggiamento e quindi una minor suscettibilità a questa malattia.

✚Approfondimento

✚Prodotti ammessi

Oidio



Il quadro patologico non è cambiato rispetto la settimana scorsa. Le condizioni climatiche di questo periodo determinano un elevato rischio epidemico. Ciononostante non si rilevano situazioni particolarmente problematiche. Non è stata segnalata la presenza di sintomi. E' possibile difendersi rinnovando la copertura con prodotti sistemici (a elevata affinità con le cere, che meglio proteggono il grappolo) abbinati a quelli di contatto.

✚Approfondimento

✚Prodotti ammessi

Black Rot



Non è stata segnalata la presenza di sintomi.

✚Prodotti ammessi

Tignoletta della vite



Il volo della tignoletta è in atto sulle aree sia litoranee che interne. Si consiglia di proseguire con il monitoraggio degli adulti e con il campionamento delle uova per intervenire al raggiungimento della soglia di intervento che, per varietà suscettibili, si attesta intorno al 5% di grappoli con uova.

✚Prodotti ammessi

Scaphoideus titanus



Con il Decreto Dirigenziale 9825 del 13 giugno 2019 disponibile nel sito del Servizio Fitosanitario Regione Toscana è stato approvato l'aggiornamento per l'anno 2019 delle misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite.

I trattamenti contro l'insetto vettore della malattia *Scaphoideus titanus* devono essere effettuati seguendo le indicazioni riportate nell'allegato F del DD 9825 del 13/06/2019.

Il monitoraggio dell'insetto vettore della malattia *Scaphoideus titanus* deve essere effettuato seguendo le indicazioni riportate nell'allegato D ed E del DD 9825 del 13/06/2019.

Per eventuali chiarimenti sull'applicazione del DD 9825 del 13.06.2019 contattare il Servizio Fitosanitario Regione Toscana nella persona del Dott. Piero Braccini (055 4385479 – 328 8877035).

✚Prodotti ammessi

Note



Note informative e metodologiche

✚Note metodologiche