

Stai accedendo alla nuova versione del portale di AgroAmbiente.Info. Per accedere alle vecchie funzioni vai al **sito originale** (<http://agroambiente.info.regione.toscana.it/arsia/arsia14>)

← Settimana precedente

AR FI GR LI LU MS PI PO PT SI



Regione Toscana

REGIONE TOSCANA

Servizio fitosanitario

Agroambiente.info

## Provincia di Grosseto - Bollettino Vite Integrato del 2020-04-30

### Fenologia



La fase fenologica prevalente è "5-6 foglie distese e infiorescenze visibili".

### Peronospora



Con lo sviluppo delle prime foglie inizia il periodo di suscettibilità della vite a questa malattia. Le precipitazioni verificatesi in questo mese hanno probabilmente causato il risveglio delle oospore, anche in assenza delle condizioni necessarie per l'infezione. Pur non essendo stati riscontrati sintomi in alcuno dei vigneti visitati (ad eccezione di un impianto), le temperature di questi ultimi giorni (almeno nelle zone costiere) e la fase fenologica sono idonee per l'instaurarsi dell'infezione primaria. In relazione agli eventi piovosi recenti (in diverse stazioni meteo sono stati raggiunti o superati i 10 mm di pioggia), in corso e previsti per i prossimi giorni e laddove la vegetazione è maggiormente sviluppata, prestare la massima attenzione alla realizzazione delle condizioni favorevoli all'instaurarsi dell'infezione primaria. Esistono le condizioni, quindi, per trattare con prodotti di copertura come ditiocarbammati o rameici, eventualmente in miscela con principi attivi citotropici o translaminari.

#### —Prodotti ammessi

Secondo il Disciplinare 2020 (Regione Toscana PSR e L.R. 25/99), sono ammessi i seguenti prodotti. Il numero massimo di trattamenti è indipendente dall'avversità verso cui si effettua. Sono ammessi massimo 7 trattamenti.

**Principi attivi e ausiliari**

*Prodotti Rameici*  
*Olio essenziale di arancio dolce*  
*Cerevisane*

**Limitazioni d'uso**

- (1) Strobiruline: max 3 interventi all'anno, indipendentemente dalle avversità di cui con Famoxadone max 1 intervento all'anno
- (2) Ditiocarbammati (Mancozeb, Metiram): la data entro la quale deve essere sospeso l'impiego dei ditiocarbammati è definita dai Bollettini Provinciali. In ogni caso non potranno essere utilizzato dopo il 30 giugno.
- (3) Folpet, Dithianon, Mancozeb, Fluazinam: complessivamente max 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, in alternativa tra loro. Con ognuno di essi max 3.
- (4) CAA: max 4 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità di cui con Benthiovalicarb max 2 interventi all'anno.
- (5) Cimoxanil: max 3 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità.
- (6) Cyazofamid, Amisulbron: max 3 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità.

Folpet (3)	(7) Fosfonati (Fosfonato di potassio, Fosfonato di disodio, Fosetil-Al): complessivamente max 10 interventi all'anno di cui max 5 con fosfonato di potassio e max 7 con fosfonato di disodio.
Mancozeb (Ditiocarbammati) (2) (3)	(9) Zoxamide: max 4 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità.
Pyraclostrobin (Strobiruline) (1)	(10) Fenilammidi: max 3 interventi all'anno.
Metiram (Ditiocarbammati) (2) (15)	(12) Ametoctradina: max 3 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità.
Iprovalicarb (CAA) (4)	(13) Fluopicolide: max 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità.
Mandipropamide (CAA) (4)	(15) Metiram: max 3 interventi indipendentemente dalle avversità.
Valifenalate (CAA) (4) + Mancozeb (Ditiocarbammati) (2) (3)	(17) Oxathiapiprolin: max 2 interventi all'anno e usare in miscela con S.A. a diverso meccanismo d'azione.
Famoxadone (Strobiruline) (1)	
Fosetil-Al (7)	
Fosfonato di disodio (7)	
Metalaxil-M (Fenilammidi) (10)	

Benalaxil  
(Fenilammidi) (10)

---

Benalaxil-M  
(Fenilammidi) (10)

---

Amisulbron (6)

---

Cyazofamid (6)

---

Fluopicolide (13)

---

Cimoxanil (5)

---

Zoxamide (9)

---

Dithianon (3)

---

Ametoctradina  
(12)

---

Fluazinam (3)

---

Oxathiapiprolin(17)