

Stai accedendo alla nuova versione del portale di AgroAmbiente.Info. Per accedere alle vecchie funzioni vai al **sito originale** (<http://agroambiente.info.regione.toscana.it/arsia/arsia14>)

← Settimana precedente

AR FI GR LI LU MS PI PO PT SI



Regione Toscana

REGIONE TOSCANA

Servizio fitosanitario

Agroambiente.info

Provincia di Grosseto - Bollettino Vite Biologico del 2020-06-11

Fenologia



La fase fenologica prevalente è "acini delle dimensioni di un grano di pepe".

Peronospora



Sono stati riscontrati sintomi in alcuni dei vigneti visitati. In questa situazione è di fondamentale importanza mantenere la copertura della vegetazione, anticipando gli eventi piovosi e affiancando al rame prodotti adesivanti, induttori di resistenza o altre sostanze antifungine come l'olio essenziale di arancio dolce. Leggere sempre scrupolosamente le etichette dei prodotti e i disciplinari di riferimento; porre particolare attenzione al numero massimo di interventi consentiti e all'intervallo minimo tra i trattamenti.

✚Prodotti ammessi biologico

✚Approfondimento

✚Fotogallery sintomi

Botritis



A partire dalla fase di allegagione e fino alla "prechiusura grappolo" è possibile intervenire con antibotritici, preferibilmente dopo aver proceduto al diradamento della vegetazione in modo da bagnare bene i grappoli.

✚Approfondimento

✚Prodotti ammessi biologico

Oidio



Non sono state osservate manifestazioni sintomatiche in alcuno degli impianti visitati. E' opportuno verificare regolarmente la presenza di infezioni e mantenere protetta la vegetazione, abbinando all'antiperonosporico zolfo a dose alta. Occorre considerare che le prime infezioni possono sfuggire alla vista a causa delle sporulazioni poco vistose e localizzate nelle parti più interne della chioma.

✚Approfondimento

✚Prodotti ammessi biologico

Tignoletta della vite



Ancora qualche cattura. Si consiglia di osservare attentamente il grado di infestazione per prepararsi a intervenire in seconda generazione.

✚Prodotti ammessi biologico

Scaphoideus titanus



Presenza di forme giovanili di I° e II° età: intervenire prima possibile con il primo intervento utilizzando polvere di roccia di caolino. Deve seguire un secondo intervento con la stessa sostanza a distanza di circa 5-7 giorni. Si consiglia di consultare il Decreto Dirigenziale 7196 del 20 maggio 2020 "Linee guida per la lotta obbligatoria alla Flavescenza dorata della vite in Toscana anno 2020".

✚Prodotti ammessi biologico



Note

Note informative e metodologiche

+Note metodologiche